



VSS Natur Rohboden

Hoher Artenreichtum, ausdauernde, stabile Wiese, Mittelland bis 1500 m ü.M.

Die VSS Natur Rohboden entspricht dem Vorbild der extensiven Trespenwiese (Magerwiese). Dank Einsatz von Englischem Raigras, schützt VSS Natur Rohboden schon kurze Zeit nach der Aussaat den Boden vor Erosion. Das Englische Raigras verschwindet 2 - 3 Jahre nach der Aussaat wieder. An seinen Platz treten die ausdauernden Magerwiesenpflanzen. Alle in der Mischung vorhandenen Wildblumen und Gräser werden in der Schweiz produziert, aufbereitet und mehrmals auf Sortenreinheit und Keimfähigkeit überprüft. OHS – bekannt für bestes Saatgut.

Standort:

Sonnige, magere (Strassen)-Böschungen ohne Humusierung (ohne Oberbodenaufgabe). Wuchshöhe 30 – 80 cm.

Besonderheiten:

Viele Pflanzen in dieser Mischung sind ausgesprochene Tiefwurzler. Deshalb bietet diese Pflanzengesellschaft auch längerfristig einen guten Erosionsschutz. Die VSS Mischungen wurden in der VSS-Norm SN 640 671 c, "Grünräume, Begrünung, Saatgut, Mindestanforderungen und Ausführungsmethoden, 2011" publiziert. Die [VSS-Mischungen](#) tragen das VSS-Qualitätslabel der [AGFF](#).

Ansaat (April bis Mitte Juni):

Idealerweise direkt auf den Rohboden. Nach der Planie VSS Natur Rohboden in einer Menge von 10 g/m² aussäen (Saatgut nicht einarbeiten!). Bei steilen Böschungen zusätzlich mit Grami-Fix Myko arbeiten. Langsame Jugendentwicklung.

Unterhalt:

Schnitthäufigkeit 1 Schnitt pro Jahr. Schnittzeitpunkte: Ein Heuschnitt ca. Mitte Juni b nach dem Abblühen der Wiesen-Margerite.

Produktspezifikation:

Art.-Nr. 182550. Zusammensetzung siehe Rückseite. Die Samenmischung wird in Säcken à 2.5 kg und 10 kg abgefüllt. Die Säcke bestehen aus einem speziellen, dreischichtigen Material, welche das Saatgut bestmöglich schützen. Um die beste Keimfähigkeit zu erhalten, sollten diese hochwertigen Samen vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen Ort gelagert und innerhalb eines Jahres aufgebraucht werden.

Zusammensetzung:

| botanica | deutsch | français | italiano |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Agrostis gigantea | Riesen-Straussgras | Agrostide géante | Cappellini maggiori |
| Cynosurus cristatus | Wiesen-Kammgras | Crételle des prés | Covetta dei prati |
| Lolium perenne | Englisches Raigras | Ivraie vivace | Loglio comune |
| Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | Pâturin des prés | Fienarola dei prati |
| ch Anthoxanthum odoratum | Duftendes Ruchgras | Flouve odorante | Paleo odoroso |
| ch Arrhenatherum elatius | Fromental Glatthafer | Fenasse | Avena altissima |
| ch Briza media | Mittleres Zittergras | Brize intermédiaire | Sonagli comuni |
| ch Bromus erectus | Aufrechte Trespe | Brome dressé | Forasacco eretto |
| ch Festuca guestfalica | Harter Schafschwingel | Fétuque de Westphalie | Festuca di Westfalia |
| ch Festuca pratensis | Wiesen-Schwingel | Fétuque des prés | Festuca dei prati |
| Festuca rubra rubra | Ausläufer-Rotschwingel | Fétuque rouge traçante | Festuca rossa |
| ch Koeleria pyramidata | Pyramiden-Kammschmiele | Koellerie pyramidale | Paleo alpino |
| ch Anthyllis carpatica | Karpaten-Wundklee | Anthyllide des carpatés | Vulneraria dei Carpazi |
| ch Hippocrepis comosa | Schopfiger Hufeisenklee | Hippocrévide à toupet | Sferracavallo comune |
| ch Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | Lotier corniculé | Ginestino comune |
| ch Medicago lupulina | Hopfenklee | Luzerne lupuline | Erba medica lupulina |
| ch Onobrychis viciifolia | Saat-Esparssette | Esparssette à feuilles de vesce | Lupinella comune |
| ch Trifolium pratense | Rot-Klee | Trèfle des prés | Trifoglio pratense |
| ch Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | Achillée millefeuille | Millefoglio montano |
| ch Campanula rapunculoides | Rapunzel-Glockenblume | Campanule raiponce | Campanula comestibile |
| ch Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | Campanule à feuilles rondes | Campanula soldanella |
| ch Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | Centauree jacée | Fiordaliso stoppione |
| ch Centaurea scabiosa | Scabiosen-Flockenblume | Centauree scabieuse | Fiordaliso vedovino |
| ch Leucanthemum vulgare | Margerite, Wucherblume | Marguerite | Margherita comune |
| ch Clinopodium vulgare | Wirbeldost | Sarriette vulgaire | Clinopodio dei boschi |
| ch Daucus carota | Gewöhnliche Möhre | Carotte sauvage | Carota selvatica |
| ch Galium verum | Echtes Labkraut | Gaillet jaune | Caglio zolfino |
| ch Hieracium pilosella | Gewöhnliches Habichtskraut | Epervière piloselle | Sparviere pelosetto |
| ch Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | Knautie des champs | Ambretto comune |
| ch Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | Léontodon hispide | Dente di leone comune |
| ch Picris hieracioides | Habichtskrautartiges Bitterkraut | Picride fausse épervière | Aspraggine comune |
| ch Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | Plantain lancéolé | Piantaggine lanciuola |
| ch Plantago media | Mittlerer Wegerich | Plantain moyen | Piantaggine pelosa |
| ch Primula veris | Frühlings-Primel | Primevère du printemps | Primula odorosa |
| ch Prunella vulgaris | Gewöhnliche Brunelle | Brunelle commune | Prunella comune |



Bekannt für bestes Saatgut.

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| ch Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuss | Renoncule bulbeuse | Ranuncolo bulboso |
| ch Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | Sauge des prés | Salvia nemorosa |
| ch Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | Pimprenelle | Salvastrella minore silvatic |
| ch Scabiosa columbaria | Tauben Skabiose | Scabieuse colombarie | Vedovina selvatica |
| ch Silene nutans | Nickendes Leimkraut | Silène penché | Silene ciandola |
| ch Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | Silène commune | Silene rigofia |
| ch Thymus pulegioides | Arznei-Feld-Thymian | Thym serpolet | Timo comune |
| ch Tragopogon orientalis | Östlicher Bocksbart | Salsifis oriental | Barba di becco comune |
| | Saathelfer | | |



Bekannt für bestes Saatgut.